

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В Г. МОСКВЕ В СРАВНЕНИИ СО СРЕДНИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО СТРАНЕ ЗА 2012–2021 ГГ.

С.Г. Копоров, Е.А. Брюн, Е.А. Кошкина, М.С. Смирновская, Е.А. Кошкин

ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»

В работе были проанализированы данные по формам федерального статистического наблюдения № 11 и № 37 за 2011–2020 гг. и статистических сборников Минздрава России, характеризующие деятельность медицинских организаций, оказывающих специализированную наркологическую помощь и позволяющих осуществлять мониторинг наркологической ситуации.

За прошедшие пять лет наблюдалось снижение обращаемости больных за наркологической помощью в г. Москве, в России темп снижения значительно ниже. Среди зарегистрированных больных потребители алкоголя составили около 70%; больных наркоманией – в два раза меньше. В Российской Федерации процент больных наркоманией более чем в два раза меньше, чем в г. Москве.

Показатель общей заболеваемости алкоголизмом и наркоманией имел тенденцию к снижению. Показатель первичной заболеваемости наркологическими расстройствами за пятилетний период в г. Москве снизился более чем в два раза.

Эффективность и качество наркологической службы определяются рядом показателей. Наиболее наглядно это характеризуют показатели ремиссии, которые в г. Москве за последние 5 лет демонстрируют стабильный рост. Процент больных наркологического профиля, включенных в стационарные реабилитационные программы от числа пациентов, госпитализированных в связи с наркологическими заболеваниями, в 2020 г. как в г. Москве, так и в России по сравнению с 2016 г. практически не изменился.

Доля больных наркологического профиля, включенных в амбулаторные реабилитационные программы от числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением, в г. Москве в 2020 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась. Показатель снятия с диспансерного наблюдения больных алкоголизмом, как и наркоманией, в связи с выздоровлением в г. Москве за прошедшие пять лет увеличился, а в Российской Федерации он несколько снизился.

Оценка деятельности медицинских организаций позволяет определить тенденции, выявить отдельные недостатки и разработать предложения для управленческих решений.

Ключевые слова: общая заболеваемость, первичная заболеваемость, алкоголизм, наркомания, показатели деятельности

NARCOLOGICAL SITUATION AND ASSESSMENT OF THE ALCOHOL AND DRUG DEPENDENCE TREATMENT SERVICE ACTIVITIES IN MOSCOW COMPARED WITH THE NATIONAL AVERAGE FOR THE 2012–2021

Koporov S.G., Bryun E.A., Koshkina E.A., Smirnovskaya M.S., Koshkin E.A.

The paper analyzes the data from the forms of Federal statistical observation No. 11 No. 37 for 2011–2020 and statistical materials of the Ministry of Health of Russia, characterizing the activities of medical organizations providing specialized alcohol and drug treatment and allowing monitoring of the drug situation.

Over the past 5 years, there has been a decrease in the number of patients seeking alcohol and drug treatment in Moscow, the decline rate in Russia was much lower. Among registered patients, alcohol users accounted for about 70%; drug addicts - two times less. In the Russia, the percentage of drug addicts is more than two times less than in Moscow.

The indicator of the general incidence of alcoholism and drug addiction tended to decrease. The rate of primary incidence of narcological disorders has more than halved over a five-year period in Moscow.

The efficiency and quality of alcohol and drug treatment services are determined by a number of indicators. This is most clearly characterized by remission rates, which in Moscow have shown a stable growth over the past 5 years. The percentage of alcohol and drug addicted patients included in inpatient rehabilitation programs out of the number of patients hospitalized due to addiction diseases in 2020, both in Moscow and in Russia, remained practically unchanged compared to 2016.

The proportion of alcohol and drug addicted patients included in outpatient rehabilitation programs out of the number of patients under dispensary observation in Moscow in 2020 increased compared to 2016. The rate of removal from dispensary observation registers of patients with alcoholism, as well as those with drug addiction, in connection with recovery has increased in Moscow over the past 5 years, and it has slightly decreased in Russia.

Evaluation of the activities of medical organizations allows us to detect trends, reveal individual shortcomings and develop proposals for management decisions.

Key words: general morbidity, primary incidence, alcoholism, drug addiction, indicators of activity

Введение

Организация доступного и эффективного лечения и реабилитации больных наркологического профиля, а также разработка программ профилактики злоупотребления психоактивными веществами являются основой улучшения качества жизни граждан и социального благополучия общества в целом. В России продолжается совершенствование наркологической службы с целью соответствия реальным потребностям общества. Продолжают развиваться ее структуры, становясь все более разнообразными, что требует углубленного анализа ее деятельности для разработки рекомендаций по оптимизации ее деятельности как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов.

Цель исследования

Мониторинг наркологической ситуации в г. Москве и России за период 2016–2020 гг.

Задачи исследования

1. Оценить и сопоставить тенденции наркологической ситуации в г. Москве и России.
2. Проанализировать комплекс показателей, значимых для оценки качества и эффективности деятельности наркологической службы.

Материалы и методы исследования

Мониторинг употребления психоактивных веществ дает возможность оценить наркологическую ситуацию и разработать рекомендации по совершенствованию оказания наркологической помощи населению, а также по профилактике, диагностике и лечению наркологических заболеваний.

Медицинской организацией составляются ежегодные отчетные формы федерального и отраслевого статистического наблюдения, утвержденные приказами Росстата и Минздрава

России. Основными отчетными формами, характеризующими деятельность медицинских организаций, оказывающих специализированную наркологическую помощь и позволяющих осуществлять мониторинг наркологической ситуации, являются: формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» и форма № 37 «Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями» [1, 2]. Сбор данных и расчет показателей осуществляется в государственных специализированных учреждениях по единой унифицированной системе. Сведения, полученные на основании данных об обрабатываемости больных за наркологической помощью, публикуются в статистических сборниках Минздрава России и используются для анализа основных тенденций распространенности наркологических заболеваний. [3, 4, 5].

Результаты исследования и обсуждение

Общая заболеваемость наркологическими расстройствами

В 2020 г. наркологическими учреждениями г. Москвы зарегистрированы 74 535 пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (далее – ПАВ), или 587,9 больных на 100 тыс. населения. При этом на конец года на диспансерном наблюдении состояло 69 500 пациентов, что составляет 93,2% от числа зарегистрированных больных.

Среди больных, обратившихся в наркологическую службу, преобладали мужчины.

В г. Москве соотношение мужчин к женщинам составило 3,5:1 (2016) и 3,3:1 (2020), для России соответственно – 4,1:1 (2016) и 3,8:1 (2020), то есть в Москве на 3 больных мужчин приходится 1 больная женщина, а в России соответственно на 4 мужчин – 1 больная женщина (рис. 1). В целом за 5-летний период это соотношение практически не изменилось.




Рис. 1. Распределение больных наркологического профиля по полу в г. Москве и России в 2016–2020 гг. (в % от числа зарегистрированных пациентов)

Fig. 1. Distribution of narcological patients by gender in Moscow and Russia in 2016–2020 (in % of the number of registered patients)

Таблица 1. Показатели общей заболеваемости наркологическими расстройствами

Table 1. Indicators of the general incidence of narcological disorders

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	2 406 702	2 238 435	2 034 982	1 898 395	1 766 065	-26,6
г. Москва • Moscow	123 634	104 732	81 375	77 380	74 535	-39,7
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	1640,8	1524,4	1385,9	1293,5	1203,5	-26,7
г. Москва • Moscow	1000,6	841,6	647,8	613,4	587,9	-41,3

Таблица 2. Показатели общей заболеваемости алкоголизмом, включая алкогольные психозы

Table 2. Indicators of the general incidence of alcoholism, including alcoholic psychoses

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	1 589 525	1 502 174	1 376 344	1 281 811	1 188 968	-23,2
г. Москва • Moscow	81 410	67 914	52 397	49 354	47 434	-41,7
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	1083,7	1023,0	937,4	873,3	810,2	-25,2
г. Москва • Moscow	658,9	545,8	417,1	391,2	374,3	-43,2

В Москве в 2020 г. показатель общей заболеваемости наркологическими расстройствами составил 587,9 на 100 тыс. населения, что почти в два раза ниже показателя по Российской Федерации. За 5 лет данный показатель в г. Москве снизился на 41%, в РФ снижение составило около 27% (табл. 1).

Контингент лиц, обратившихся за наркологической помощью в государственные медицинские учреждения, имеет свои особенности распределения по нозологическим формам. Основной процент зарегистрированных пациентов с психическими и поведенческими расстройствами наркологического профиля составляют потребители алкоголя, доля которых в 2020 г. составила 67,0%. Процент лиц с расстройствами вследствие употребления наркотиков в г. Москве существенно ниже и составил 29,2%. В Российской Федерации потребители алко-

голя составляют 77,6%, наркотиков – 12,7%, то есть в г. Москве доля потребителей наркотиков, обратившихся в государственные наркологические учреждения практически более чем в два раза выше, чем в Российской Федерации.

Общая заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя

В наркологическую службу г. Москвы в 2020 г. обратились за помощью 49 949 пациентов с алкогольными проблемами, из них 95,0% имели диагноз «алкоголизм», включая алкогольные психозы; на долю пациентов с пагубным употреблением алкоголя пришлось 5,0% больных. По сравнению с 2016 г. число лиц, обратившихся за помощью, сократилось в 1,7 раза, однако соотношение диагностических групп пациентов с алкогольными проблемами сохранилось на прежнем уровне.

Рис. 2. Распределение потребителей алкоголя, обратившихся за наркологической помощью, по возрасту в г. Москве в 2016–2020 гг. (в % от числа зарегистрированных пациентов)

Fig. 2. Distribution of alcohol consumers who applied for drug treatment by age in Moscow in 2016–2020 (in % of the number of registered patients)




Рис. 3. Распределение потребителей алкоголя, обратившихся за наркологической помощью, по возрасту в России в 2016–2020 гг. (в % от числа зарегистрированных пациентов)

Fig. 3. Distribution of alcohol consumers who applied for drug treatment by age in Russia in 2016–2020 (in % of the number of registered patients)

	0-14	15-17	18-19	20-39	40-59	60 и ст.
■ 2016	0,3	1,9	1	38,1	48,7	12,1
■ 2020	0,2	1,3	0,8	33,6	49,1	14,9

Среди потребителей алкоголя, обратившихся за наркологической помощью, в г. Москве в 2020 г., так же как и в 2016 г., преобладала возрастная группа 40–59 лет, которая за пять лет осталась практически на том же уровне. За этот период доля групп лиц в возрасте 20–39 лет уменьшилась на 3,5%. Изменения процентного распределения также отмечены в возрасте 15–17 лет, доля которого несколько уменьшилась. В то же время доля лиц в возрасте 60 лет и старше увеличилась на 5,3% (рис. 2).

Таким образом, наблюдалось увеличение доли лиц в возрасте 60 лет и старше, получающих наркологическую помощь в медицинских организациях г. Москвы.

Среди больных наркологического профиля в Российской Федерации в 2020 г., так же как и в 2016 г., преобладает возрастная группа 40–59 лет, остальные возрастные группы имели тенденцию к снижению, кроме группы 60 лет и старше, доля которой увеличилась на 2,8%. Таким образом, тенденции динамики возрастного распределения в г. Москве и в Российской Федерации совпадают (рис. 3).

Показатель общей заболеваемости алкоголизмом, включая алкогольные психозы, в г. Москве в 2020 г. составил 374,3 больных на 100 тыс. населения. По отношению к 2016 г. показатель снизился на 43,2%. В Российской Федерации этот показатель более чем в два раза превышает московский, но тенденция к снижению данного показателя отмечена и в среднем по стране, но темп снижения был меньше (табл. 2).

Показатель общей заболеваемости алкогольными психозами в г. Москве в 2020 г. составил 7,6 на 100 тыс. населения, и этот показатель в 3,5 раз ниже, чем в Российской Федерации. По сравнению с 2016 г. показатель общей заболеваемости алкогольными психозами в г. Москве снизился на 40%, в Российской Федерации – на 33% (табл. 3).

Показатель обращаемости пациентов с пагубным употреблением алкоголя в 2020 г. составил в г. Москве 19,8 на 100 тыс. населения, что в 6,5 раза ниже, чем в среднем по стране. По сравнению с 2016 г. как в г. Москве, так и в Российской Федерации этот показатель снизился на 39% (табл. 4).

Таблица 3. Общая заболеваемость алкогольными психозами

Table 3. General incidence of alcoholic psychoses

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	59 471	50 299	47 149	45 245	39 442	-33,6
г. Москва • Moscow	1580	1094	1048	1058	964	-38,9
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	40,5	34,3	32,1	30,8	26,9	-33,6
г. Москва • Moscow	12,8	8,8	8,3	8,4	7,6	-40,6

Таблица 4. Обращаемость пациентов с пагубным употреблением алкоголя

Table 4. Treatment of patients with harmful alcohol use

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	298 833	256 649	218 070	200 022	181 792	-39,2
г. Москва • Moscow	4002	4117	2215	2570	2515	-37,2
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	203,7	174,8	148,5	136,3	123,9	-39,2
г. Москва • Moscow	32,4	33,1	17,6	20,4	19,8	-38,9




Рис. 4. Распределение потребителей наркотиков, обратившихся за наркологической помощью, по возрасту в г. Москве в 2016–2020 гг. (в % от числа зарегистрированных пациентов)

Fig. 4. Distribution of drug users who applied for drug treatment by age in Moscow in 2016–2020 (in % of the number of registered patient)




Рис. 5. Распределение потребителей наркотиков, обратившихся за наркологической помощью, по возрасту в России в 2016–2020 гг. (в % от числа зарегистрированных пациентов)

Fig. 5. Distribution of drug users who applied for drug treatment by age in Russia in 2016–2020 (in % of the number of registered patients)

Общая заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков

Среди общего контингента обратившихся за лечением в наркологическую службу г. Москвы число больных, употребляющих различного вида наркотики, в 2 раза меньше, чем больных алкоголизмом. В среднем по России таких лиц почти в 4 раза меньше, чем в г. Москве.

Данная группа больных требует к себе пристального внимания. Это связано с тем, что, как правило, это лица более молодого возраста, и у них помимо ассоциированных соматических заболеваний, свойственных болезням зависимости, присутствуют сопутствующие инфекционные заболевания, такие как ВИЧ и гепатиты.

В г. Москве, как и в России, в 2020 г. наблюдалось перераспределение процентного соотношения всех возрастных групп, за

счет сокращения доли лиц в возрасте 18–19 и 20–39 лет и увеличения доли больных в возрасте 40–59 лет на 19,5% в г. Москве и на 10,0% в Российской Федерации. Полученные данные свидетельствуют о том, что среди больных наркоманией увеличивается процент больных более старших возрастов (рис. 4, 5).

Показатель общей заболеваемости наркоманией в г. Москве в 2020 г. составил 171,6 на 100 тыс. населения, что выше аналогичного показателя по России на 11,0%. В г. Москве по сравнению с 2016 г. отмечено снижение этого показателя на треть; по России темп снижения несколько меньше (табл. 5).

За пятилетний период произошли некоторые изменения в структуре потребляемых психоактивных веществ (ПАВ). В г. Москве, как и в Российской Федерации в целом, среди зарегистрированных больных наркоманией преобладают больные, употребляющие опиоиды. За пять лет данный показатель

Таблица 5. Показатели общей заболеваемости наркологическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков

Table 5. Indicators of the overall incidence of narcological disorders associated with drug use

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	292 407	273 094	250 634	236 214	224 117	-23,4
г. Москва • Moscow	31 303	27 044	23 887	22 495	21 758	-30,5
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	199,4	186,0	170,7	160,9	152,7	-23,4
г. Москва • Moscow	253,3	217,3	190,2	178,3	171,6	-32,3

Таблица 6. Показатель обращаемости пациентов с пагубным употреблением наркотических ПАВ

Table 6. Rate of treatment of patients with harmful use of narcotic surfactants

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	203 575	186 061	172 757	165 019	157 388	-22,7
г. Москва • Moscow	6351	5212	2471	2537	2351	-63,0
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	138,8	126,7	117,6	112,4	107,3	-22,7
г. Москва • Moscow	51,4	41,9	19,7	20,1	18,5	-64,0

Таблица 6. Показатель обращаемости пациентов с пагубным употреблением наркотических ПАВ

Table 6. Rate of treatment of patients with harmful use of narcotic surfactants

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	229 611	190 800	174 994	163 224	127 895	-44,3
г. Москва • Moscow	10253	6345	5286	6094	4908	-52,2
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	156,5	129,9	119,2	111,2	87,2	-44,3
г. Москва • Moscow	83,0	51,0	42,1	48,3	38,7	-53,4

снизились на 17,9%, а в России несколько больше – на 22,7%. Второе ранговое место занимали пациенты с зависимостью от других наркотиков и их сочетаний, доля которых за исследуемый период выросла в г. Москве на 39,8%, а в Российской Федерации – на 63%. Процент потребителей психостимуляторов заметно увеличился, а употребление каннабиноидов увеличилось незначительно (рис. 6).

Показатель обращаемости пациентов с пагубным употреблением наркотиков в г. Москве в 2020 г. составил 18,5 на 100 тыс. населения, и за пятилетний период он снизился на 64%. Следу-

ет отметить, что за последние три года в России этот показатель в 5 раз выше, чем в г. Москве. Однако общая тенденция к снижению отмечается и в России (табл. 6).

Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами

Показатель первичной заболеваемости широко используется в мире для оценки ситуации с употреблением алкоголя и наркотиков, он отражает число больных, впервые обратившихся за наркологической помощью в медицинские учреждения, и приводится во всех международных отчетах.




Рис. 6. Структура общей заболеваемости наркоманией в г. Москве и в РФ (в % от числа зарегистрированных)

Fig. 6. The structure of the general incidence of drug addiction in Moscow and in the Russian Federation (in % of the number of registered)

Таблица 7. Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами

Table 7. Primary incidence of narcological disorders

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	229 611	190 800	174 994	163 224	127 895	-44,3
г. Москва • Moscow	10253	6345	5286	6094	4908	-52,2
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	156,5	129,9	119,2	111,2	87,2	-44,3
г. Москва • Moscow	83,0	51,0	42,1	48,3	38,7	-53,4

Таблица 8. Первичная заболеваемость алкоголизмом, включая алкогольные психозы

Table 8. Primary incidence of alcoholism, including alcoholic psychoses

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	95 149	81 809	77 529	76 117	59 108	-37,9
г. Москва • Moscow	3070	2418	2886	3171	2397	-22,5
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	64,9	55,7	52,8	51,8	40,3	-37,9
г. Москва • Moscow	24,8	19,4	22,9	25,1	18,9	-25,8

Таблица 9. Первичная заболеваемость алкогольными психозами

Table 9. Primary incidence of alcoholic psychoses

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	25 498	19 595	18 513	18 363	15 190	-40,4
г. Москва • Moscow	594	268	321	442	358	-39,8
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	17,4	13,3	12,6	12,5	10,4	-40,2
г. Москва • Moscow	4,8	2,1	2,5	3,5	2,8	-41,2

В 2020 г. в медицинские организации г. Москвы за наркологической помощью в амбулаторных условиях впервые в жизни обратились 4908 пациентов с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления ПАВ, что составило 38,7 на 100 тыс. населения. Данный показатель более чем в 2 раза меньше среднероссийского уровня. Отмечается снижение уровня первичной заболеваемости наркологическими расстройствами в г. Москве за пятилетний период на 53,4%. В стране за этот период также выявляется тенденция к снижению (44,3%) (табл. 7).

От всех впервые зарегистрированных в 2020 г. в г. Москве доля пациентов с патологией, вызванной употреблением алкоголя, увеличилась и составила 63,7% (2016 г. – 51,7%). В Российской Федерации доля потребителей алкоголя среди больных снизилась и составила 69,9% (2016 г. – 72,1%).

Доля впервые зарегистрированных пациентов с диагнозом «наркомания» и «употребление наркотиков с пагубными последствиями» от общего числа больных в г. Москве в 2020 г. снизилась и составила 34,8% (2016 г. – 47,4%). В России

в 2020 г. отмечено некоторое увеличение показателя, который составил 28,9% от общего числа больных (2016 г. – 26,3%). Следовательно, в 2020 г., как и в предыдущие годы, в первичной обращаемости больных преобладают больные алкоголизмом, как в г. Москве, так и в целом по стране.

Первичная заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя

Показатель первичной заболеваемости алкоголизмом, включая алкогольные психозы, в г. Москве в 2020 г. составил 18,9 на 100 тыс. населения, что в два раза ниже показателей в Российской Федерации. За пятилетний период данный показатель в г. Москве снизился на 25,8%. В России также отмечается снижение, причем оно более выраженное (табл. 8).

В г. Москве в 2020 г. показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами равен 2,8 на 100 тыс. населения, и это более чем в три раза ниже, чем в Российской Федерации. За пятилетний период как в г. Москве, так и в России этот показатель снизился более чем на 40% (табл. 9).

Таблица 10. Первичная обращаемость пациентов по поводу пагубного употребления алкоголя

Table 10. Primary treatment of patients for harmful alcohol use

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	70 442	54 186	46 269	41 213	30 347	-56,9
г. Москва • Moscow	2232	1871	697	995	728	-67,4
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	48,0	36,9	31,5	28,1	20,7	-56,9
г. Москва • Moscow	18,1	15,1	5,5	7,9	5,7	-68,5

Таблица 11. Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков

Table 11. Primary incidence of drug-related disorders

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	16 333	16 386	14 964	14 519	12 495	-23,5
г. Москва • Moscow	1255	1184	1084	1172	1130	-10,0
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	11,1	11,2	10,2	9,9	8,5	-23,4
г. Москва • Moscow	10,1	9,5	8,6	9,3	8,9	-12,4

Таблица 12. Первичная обращаемость пациентов по поводу пагубного употребления наркотиков

Table 12. Primary treatment of patients for harmful drug use

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Число зарегистрированных больных • Number of registered patients						
Российская Федерация • RF	44 105	35 340	33564	29272	24 456	-44,6
г. Москва • Moscow	3609	834	572	689	579	-84,0
Число больных на 100 тыс. населения • Number of patients per 100 thousand population						
Российская Федерация • RF	30,1	24,1	22,9	19,9	16,7	-44,5
г. Москва • Moscow	29,2	6,7	4,5	5,4	4,6	-84,3

По поводу пагубного (с вредными последствиями) употребления алкоголя в 2020 г. в диспансерные отделения г. Москвы обратилось 728 пациентов, что составило 5,7 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2016 г. отмечено снижение данного показателя более чем на 40% как в г. Москве, так и в России. Однако в г. Москве его значение меньше, чем по стране в целом, более чем в 3 раза (табл. 10).

Первичная заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков

В 2020 г. в г. Москве и в Российской Федерации показатель первичной заболеваемости наркоманией практически одинаков и составил на 100 тыс. населения 8,9 и 8,5 соответственно. По сравнению с 2016 г. данный показатель в г. Москве снизился на 12,4%, в России – на 23,4% (табл. 11).

В 2020 г. наркологической службой г. Москвы в впервые в жизни установленным диагнозом пагубного употребления наркотиков было зарегистрировано 579 пациентов, или 4,6 на 100 тыс. населения.

По сравнению с 2016 г. отмечено значительное снижение данного показателя в г. Москве, снижение по стране заметно ниже (табл. 12).

Показатели оценки качества деятельности наркологической службы

Качество и эффективность оказания наркологической помощи по лечебной и реабилитационной деятельности характеризуется рядом показателей. В первую очередь это показатели включения пациентов в амбулаторные и стационарные реабилитационные программы, а также длительность ремиссии в отдельных нозологических группах болезней, повторность госпитализаций и показатель прекращения диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением (стойким улучшением).

Показатели ремиссии в анализируемых нозологических группах как в г. Москве, так и в России за последние пять лет свидетельствуют о стабилизации ряда показателей и некотором росте других, характеризующих число больных, находящихся в ремиссии.



Рис. 7. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента)
Fig. 7. The number of alcoholism patients in remission for more than 2 years (per 100 patients of the average annual contingent)



Рис. 8. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента)
Fig. 8. The number of drug addiction patients in remission for more than 2 years (per 100 patients of the average annual contingent)

За исследуемый период времени число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, в 2020 году в г. Москве составило 11,8 на 100 больных среднегодового контингента и имело более выраженную тенденцию к росту – 32,6 %. В Российской Федерации тенденция к росту менее выражена (рис. 7).

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, в Москве составило 11,4 и имело тенденцию к росту (20,0 %). В Российской Федерации рост этого показателя менее выражен (рис. 8).

Уровень повторных госпитализаций в стационар является критерием качества работы наркологической службы. На формирование этого показателя влияет целый ряд факторов организационного характера, таких как доступность и эффективность стационарного и амбулаторного лечения, а также наличие подразделений амбулаторной и стационарной реабилитации и т.п.

Показатель повторной госпитализации больных алкоголизмом (без алкогольных психозов) в г. Москве незначительно увеличился (2,1%), при этом 43,5% госпитализировались повторно. В Российской Федерации показатель практически стабилен (26,7%), и он ниже, чем в г. Москве. Повторные госпитализации по поводу алкогольных психозов заметно ниже показателя повторных госпитализаций по алкоголизму, как в г. Москве, так и в России данный показатель имеет тенденцию к снижению. Повторные госпитализации по поводу наркомании в г. Москве и России имеют неоднозначные тенденции. В г. Москве показатель за пять лет вырос на 18,5% и составил 41,7% от общего числа госпитализированных больных наркоманией, в то время как в России он снизился на 32,4% и составил 29,5% (рис. 9).

Процент больных наркологического профиля, включенных в стационарные реабилитационные программы от числа пациентов, госпитализированных в связи с психическими

Таблица 13. Показатели включения пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением ПАВ в стационарные реабилитационные программы (в %)

Table 13. Indicators of inclusion of patients with mental and behavioral disorders associated with the use of surfactants in inpatient rehabilitation programs (in %)

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Включены в программу • Included in the program						
Российская Федерация RF	5,2	5,4	5,7	5,4	5,4	3,8
г. Москва • Moscow	5,4	6,0	6,6	7,4	5,4	0,0
Успешно завершили • Successfully completed						
Российская Федерация RF	81,5	81,3	85,5	85,9	85,4	4,8
г. Москва • Moscow	76,7	85,5	88,0	91,9	92,5	20,6

Таблица 14. Показатели включения пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением ПАВ в амбулаторные реабилитационные программы (в %)

Table 14. Indicators of inclusion of patients with mental and behavioral disorders associated with the use of surfactants in outpatient rehabilitation programs (in %)

	2016	2017	2018	2019	2020	Прирост Growth 2020/2016 (%)
Включены в программу • Included in the program						
Российская Федерация RF	3,7	3,8	5,0	5,5	4,7	27,02
г. Москва • Moscow	3,0	3,5	7,0	5,9	5,6	86,7
Успешно завершили • Successfully completed						
Российская Федерация RF	54,8	53,9	55,8	53,6	54,7	-0,18
г. Москва • Moscow	60,5	62,3	75,4	68,9	69,2	14,3




Рис. 9. Показатели повторной госпитализации больных наркологическими расстройствами в специализированные стационары (от общего числа госпитализированных, в %)

Fig. 9. Indicators of repeated hospitalization of patients with narcological disorders in specialized hospitals (of the total number of hospitalized, in %)

расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением ПАВ, в 2020 году как в г. Москве, так и в России по сравнению с 2016 г. практически не изменился. Удельный вес успешно завершивших программу от числа включенных в г. Москве увеличился на 20,6%. В России это увеличение было незначительным (табл. 13).

Доля больных наркологического профиля, включенных в амбулаторные реабилитационные программы от числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением, в г. Москве в 2020 году по сравнению с 2016 увеличилась и составила 5,6%. Доля успешно завершивших программу увеличилась на 14,3%, в то время как в России она практически не изменилась (табл. 14).

Сопоставление показателей с базовыми, определенными ВЦП «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими и поведенческими расстройствами» на 2020 г., свидетельствует о невыполнении как в г. Москве, так и в Российской Федерации показателя включения в стационарные реабилитационные программы пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением ПАВ (базовый – 5,65%); о перевыполнении показателя включения в амбулаторные реабилитационные программы (базовый – 4,63%) [6].

Показатель снятия с диспансерного наблюдения больных алкоголизмом в связи с выздоровлением (длительным воздержанием) в г. Москве за прошедшие пять лет увеличился и составил 2,6 на 100 больных среднегодового контингента в 2020 г. В Российской Федерации этот показатель несколько снизился.

Показатель снятия с диспансерного наблюдения больных наркоманией в связи с выздоровлением (длительным воздер-

жением) в г. Москве также увеличился и составил 3,0, в России показатель также снизился (рис. 10, 11).

Следует отметить, что показатель снятия с наблюдения в связи с выздоровлением за весь анализируемый период в г. Москве ниже, чем по России, при этом в г. Москве за прошедшие пять лет наблюдался незначительный рост, а в Российской Федерации – некоторое снижение данных показателей.

Выводы

1. За прошедшие пять лет снижение обращаемости больных за наркологической помощью составило в г. Москве более 40%, в России темп снижения значительно ниже. Среди обратившихся больных в 2020 г., как и в предыдущие годы, преобладали мужчины. Среди зарегистрированных больных за анализируемый период основной процент составляли потребители алкоголя. Процент больных с расстройствами вследствие употребления наркотиков в два раза меньше. В России процент больных наркоманией, обратившихся за помощью, более чем в два раза меньше, чем в Москве.

2. В г. Москве среди больных алкоголизмом, обратившихся за наркологической помощью, все годы преобладала возрастная группа 40–59 лет; группа лиц более молодого возраста (15–39 лет) несколько уменьшилась, а доля лиц в возрастной группе 60 лет и старше – увеличилась. Показатель общей заболеваемости алкоголизмом имел тенденцию к снижению, при этом за пять лет он снизился на 43,2%. Этот показатель в г. Москве в два раза ниже, чем в России. По сравнению с 2016 г. общая заболеваемость алкогольными психозами в г. Москве снизилась на 40% и ниже среднего показателя по России в 3,5 раза. Обращаемость пациентов с пагубным употреблением в г. Москве




Рис. 10. Показатели снятия с наблюдения пациентов с алкоголизмом в связи с выздоровлением (длительным воздержанием)

(на 100 больных среднегодового контингента)

Fig. 10. Indicators of withdrawal from observation of patients with alcoholism due to recovery (prolonged abstinence) (per 100 patients of the average annual contingent)




Рис. 11. Показатели снятия с наблюдения пациентов с наркоманией в связи с выздоровлением (длительным воздержанием) (на 100 больных среднегодового контингента)

Fig. 11. Indicators of withdrawal from observation of patients with drug addiction due to recovery (prolonged abstinence) (per 100 patients of the average annual contingent)

за пять лет снизилась на 38,9%. Следует отметить, что обращаемость на 100 тыс. населения в г. Москве в 6 раз ниже, чем в России. Приведенные данные свидетельствуют о более низком уровне обращаемости в г. Москве больных алкоголизмом в государственные наркологические учреждения.

3. В течение анализируемого пятилетнего периода среди больных наркоманией преобладала возрастная группа 20–39 лет. К 2020 г. произошло перераспределение возрастных групп в сторону увеличения возраста больных, то есть увеличилась возрастная группа 40–59 лет за счет уменьшения доли больных младших возрастных групп. Показатель общей заболеваемости наркоманией имеет тенденцию к снижению. По сравнению с 2016 г. он снизился на треть, но его уровень в

г. Москве все годы был выше, чем в России. В структуре больных наркоманией в 2020 г., как и в прежние годы, преобладали больные, употребляющие опиоиды, второе ранговое место занимали пациенты с зависимостью от других наркотиков и их сочетаний; далее – потребители психостимуляторов и каннабиноидов. За пятилетний период уменьшилась доля учтенных потребителей опиоидов, увеличилась доля потребителей каннабиноидов и психостимуляторов. Наибольший рост отмечался среди потребителей других наркотиков и их сочетаний, доля которых увеличилась почти на 49%. Обращаемость пациентов с пагубным употреблением наркотиков в г. Москве за пятилетний период снизилась на 64%. Следует отметить, что за последние три года в г. Москве этот показатель в 5 раз ниже, чем в среднем по России.

4. Показатель первичной заболеваемости наркологическими расстройствами за пятилетний период в г. Москве снизился более чем на 50%. В 2020 г., как и в предыдущие годы, в первичной обращаемости больных преобладали больные алкоголизмом как в г. Москве, так и в целом по стране. В г. Москве показатель по психическим и поведенческим расстройствам, связанным с употреблением алкоголя в два и более раз ниже, чем в России. В г. Москве и в России в 2020 г. показатель первичной заболеваемости наркоманией практически одинаков. По сравнению с 2016 г. данный показатель в г. Москве и в России снизился, но в среднем по России это снижение более выражено.

5. Эффективность и качество наркологической службы определяются рядом показателей. Наиболее наглядно это характеризуют показатели ремиссии свыше двух лет, которые в г. Москве за последние пять лет демонстрируют стабильный рост по алкоголизму и наркомании. В России рост этих показателей менее выражен.

6. Показатель повторной госпитализации больных алкоголизмом (без АП) в г. Москве незначительно увеличился, при этом он высок (43,5% больных госпитализировались повторно). В России показатель заметно ниже, чем в г. Москве (26,7%). Повторные госпитализации по поводу наркомании в Москве и России имеют неоднозначные тенденции. В г. Москве показатель за пять лет вырос, тогда как в России он снизился.

7. Процент больных наркологического профиля, включенных в стационарные реабилитационные программы от числа пациентов, госпитализированных в связи с употреблением ПАВ, в 2020 г. как в г. Москве, так и в России практически не изменился и составил около 5%. Доля успешно завершивших программу от числа включенных в г. Москве значительно увеличилась.

8. Доля больных наркологического профиля, включенных в амбулаторные реабилитационные программы от числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением, в г. Москве в 2020 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась и составила 5,6%. Доля успешно завершивших программу увеличилась.

9. Показатель снятия с наблюдения в связи с выздоровлением (длительным воздержанием) за прошедшие пять лет оставался на низком уровне как в г. Москве, так и в России, но в г. Москве он несколько ниже. Данная ситуация требует

пристального внимания и разработки рекомендаций с целью повышения приверженности к лечению больных наркологического профиля.

Список использованных источников

1. Отчетные формы Федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» (приказ от 16 октября 2013 года № 410 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения наркологическими расстройствами». Федеральная служба государственной статистики). [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52009/54315b435143cf32dfa167309df622a14bde97e/ (Дата обращения 01.12.2022).
2. Отчетные формы Федерального статистического наблюдения № 37 «Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями» (приказ от 16 октября 2013 года № 410 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения наркологическими расстройствами». Федеральная служба государственной статистики). [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52009/507ad74bf4954fd4849bcb5c0fb048fba819b490/ (Дата обращения 01.12.2022).
3. Деятельность наркологической службы Российской Федерации в 2017–2018 годах. Аналитический обзор. – М.: ННЦ наркологии – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского», 2020. [Электронный ресурс]. URL: <http://nncn.serbsky.ru/wp-content/uploads/2020/10/Наркологическая-служба-РФ.-АО-2017-2018.pdf>. (Дата обращения 01.12.2022).
4. Деятельность наркологической службы Российской Федерации в 2018–2019 годах. Аналитический обзор. – М.: ННЦ наркологии – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского», 2020. [Электронный ресурс]. URL: <http://nncn.serbsky.ru/wp-content/uploads/2020/10/Наркологическая-служба-РФ.-АО-2018-2019.pdf>. (Дата обращения 01.12.2022).
5. Деятельность наркологической службы Российской Федерации в 2019–2020 годах. Аналитический обзор. – М.: ННЦ наркологии – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2021. [Электронный ресурс]. URL: <http://nncn.serbsky.ru/wp-content/uploads/2021/12/Наркологическая-служба-РФ.-АО-2019-2020.pdf>. (Дата обращения 01.12.2022).
6. Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»: приказ Минздрава России от 24 марта 2020 г. № 232. [Электронный ресурс]. URL: <https://minzdrav.gov.ru/documents>. (Дата обращения 01.12.2022).

Об авторах

Копоров Сергей Георгиевич – директор ГБУЗ города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук

Адрес: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 37/1

Тел. + 7 (499) 179-22-44

e-mail: mnpcn@mail.ru

Брюн Евгений Алексеевич – президент ГБУЗ города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук

Адрес: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 37/1

Тел. + 7 (499) 178-35-05

e-mail: mnpcn@mail.ru

Кошкина Евгения Анатольевна – главный научный сотрудник ГБУЗ города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук

Адрес: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 37/1

Тел: + 7 (499) 178-17-69

e-mail: epid@list.ru

Смирновская Маргарита Сергеевна – научный сотрудник ГБУЗ города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»

Адрес: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 37/1

Тел: + 7 (499) 178-17-69

e-mail: msmirnovskaya@mail.ru

Кошкин Егор Анатольевич – лаборант-исследователь ГБУЗ города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»

Адрес: 109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 37/1

Тел: + 7 (499) 178-17-69

e-mail: yqgo282@yandex.ru